

PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN (PEP)

¿Qué es?

COMBATEN LA REPLICACIÓN DEL VIH EN EL ORGANISMO.

USO DE **ANTIRRETROVIRALES** A CORTO PLAZO PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE INFECCIÓN POR EL VIH DESPUÉS DE UNA POTENCIAL EXPOSICIÓN AL VIRUS

SIGNIFICA TOMAR MEDICAMENTOS DESPUÉS DE UNA

posible exposición

AL VIH PARA PREVENIR CONTRAERLO.

Ocupacional:

CONSECUENCIA DE TU TRABAJO

No ocupacional:

EXPOSICIÓN SEXUAL CONSENTIDA (SIN PROTECCIÓN O CON FALLO DE ESTA), ASOCIADA A VIOLENCIA SEXUAL, EXPOSICIÓN EN USUARIOS DE DROGAS INTRAVENOSAS CON MATERIAL CONTAMINADO, ENTRE OTRAS.



¿CUÁNDO INICIAR LA PEP?

TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS EN LOS CASOS DE RIESGO IDENTIFICADOS

¿Qué medicamentos incluye?

INHIBIDORES DE INTEGRASA COMO EJE DEL TRATAMIENTO.

CUÁNTO DURA LA PEP?

EL TRATAMIENTO DURA 30 DÍAS Y DEBE COMENZARSE ANTES DE TRANSCURRIDAS 72 HORAS DE LA EXPOSICIÓN.



Es un medicamento fácil de tomar.

¿Y SI ENCUENTRO BARRERAS PARA LA PEP?

Respetuosamente solicita al profesional de salud que revise el protocolo para la atención por exposición de riesgo biológico laboral o no laboral ante VIH, Hepatitis B y Hepatitis C, la Circular No. 13 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social y las recomendaciones 5 y 6 de la GPC.

Recuérdale

QUE SÓLO SE CUENTA CON 72 HORAS PARA INICIAR UN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL QUE PUEDA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL VIH.



QUIERO CONOCER MÁS:

REVISA EL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN POR EXPOSICIÓN DE RIESGO BIOLÓGICO LABORAL O NO LABORAL ANTE VIH, HEPATITIS B Y HEPATITIS C